# LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

## Égéstermék-elvezető (kémény) tisztításával és a tüzelő-, fűtő berendezések használatával kapcsolatos tájékoztatás.

- Az égéstermék-elvezetővel (kéménnyel) rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a **teljesítményének megfelelő**, illetőleg **arra méretezett** – szilárd tüzelésű berendezés esetén **legalább évente**, gáz tüzelésű berendezés esetén **legalább kétévente tisztított és ellenőrzött –** kéményhez csatlakoztatható.

- A **kémény**, a **tüzelő berendezés** és az **éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani**, vagy olyan hőszigetelést alkalmazni, hogy a hő a fűtőberendezés legnagyobb terhelése mellett **se jelentsen gyújtási veszélyt**.

- Éghető padlóburkolatú helyiségben a szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezés ajtaja elé **nem éghető anyagú** parázsfelfogót kell elhelyezni.

- Hasznos tanácsok: a tüzelőberendezéseket **évente** ellenőriztessük, konyhai gáztűzhely használatakor **szellőztessünk**, gáztűzhelyet fűtés céljára **ne használjunk**, kihűlt fűtőberendezések üzembe helyezésekor a kémény átmelegedéséig szellőztessünk, valamint **szerezzünk be** szén-monoxidérzékelő berendezést.
- Az elektromos fűtő berendezések esetében figyeljünk oda, hogy **eldőlés mentesen** használjuk, éghető anyagtól **olyan távolságra helyezzük el, hogy azt ne gyújtsa meg**, illetve arra, hogy az elektromos hálózatra csatlakoztatás során lehetőleg **hosszabbítót és elosztót** csak olyat használjunk, amely **arra alkalmas**.

### A szénmonoxid mérgezés megelőzése, tünetei és teendők mérgezés gyanúja esetén.

- A szén-monoxid színtelen, szagtalan gáz, a levegőnél valamivel könnyebb, az **esetleges mérgezés leggyakoribb lehetősége a nyílt égésterű tüzelőberendezésekkel ellátott helyiségekben van**. A nem tisztított kémény, az erős külső szél, a teljesen szigetelt nyílászárók, valamint a szabadba vezetett szagelszívó használata elősegítik a **mérgező gáz légtérbe jutását**.

- A szén-monoxid mérgezés tünetei egyrészt az általános mérgezési tünetekhez hasonlóak, illetve van néhány speciális tünete pld. **émelygés, fejfájás, hányinger, hányás, végtagok gyengesége, izomfájdalom, mozgásképtelenség, hallucináció, eszméletvesztés**. Ellátás során mielőtt a helyiségbe lépünk gondoskodjunk az **átszellőztetésről**. A sérültet vigyük **szabad levegőre, nyugtassuk, fektessük**. Ha eszméletlen helyezzük **stabil oldalfektetésbe, ha leállt a légzés végezzünk újraélesztést**.